

退緑黄化病・黄化えそ病耐病

4種複合耐病性品種

ネクスター



<<超新聖>>

ちょう しんせい

黄化えそ病耐性
(MYSV耐性)

退緑黄化病耐性

うどんこ病耐性

褐斑病耐性



朝日アグリア株式会社



株式会社 久留米種苗園芸

黄化えそ・退緑黄化・うどん粉・褐斑病



四種複合耐病性を持つ、
ネクスターに新しく加わりました

超新聖

ネクスター

ちょう しんせい

きゅうり

【特性】

- ・ 節成性60~80%、1~2果成を示し、子枝・孫枝とも節成になり1~2果成を示す。摘芯栽培つるおろし栽培兼用品種。
- ・ 葉はやや濃緑色。生育はやや早く、子枝の発生早も早く、徒長しにくい枝が確実に発生。後期まで草勢が衰えにくい品種。
- ・ 果実は長さ22cm程度、肩落ち・尻細果の発生も少なく果形安定。
- ・ 果実肥大が早く初期より多収穫が望める品種。高・低温期でも色・艶が落ちず、市場評価の高い胡瓜が収穫できる。
- ・ 果実肥大が早く、低温寡日照期でも安定して且つ、連続して多収穫となる。
- ・ 耐病性については、黄化えそ病・退緑黄化病・褐斑病・うどんこ病に極強くべと病などにも強い。

【適応作型】 抑制・越冬・半促成栽培に適する。

——— 定植期 ■ 収穫期

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
抑制 越冬 半促成		———	———	———	———	———		———	———	———		
		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———
		———	———	———	———	———	———	———	———	———	———	———

【栽培の要点】

定植後の活着をスムーズに行う事が大切で、活着後勢いが出始めまでは、こまめに灌水し勢いよく生育させる。。活着つり上げ後、水を控え気味に行いながらハウス内の湿度管理に注意(過乾燥にしない)しながら生育させる。

雌花が2本程度肥大始めたら、株元へ灌水を行い果実肥大を促してやる。この時一度に多量の灌水を施すとバランスを崩すことになるので、徐々に灌水量を増やして行くようにする。収穫期間は肥切れにならないように注意する。

ごーどさいこう

こうき

※※ブルームレス台木は、「Gold西光」「光輝」とご指名下さい※※



朝日アグリア株式会社

埼玉県児玉郡神川町渡瀬222

TEL 0274-52-2738

FAX 0274-52-4534

販売元



株式会社 久留米種苗園芸

福岡県八女市豊福1226番地

育種元 TEL 0943-24-2747

FAX 0943-24-2721

http://www.kurume-seed.com